

农作物病虫害情报

第十期

(2021年8月11日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址:开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

晚稻早插植田块病虫害防治意见

据我中心8月9-11日到月山、蚬冈、赤水、大沙和长沙等镇(街)调查,目前我市晚稻总体处于分蘖初期,部分已进入分蘖末期。病虫害总体属轻、局部中等发生,主要为害早插植田块,主要病虫害为稻纵卷叶螟和稻飞虱。

一、稻纵卷叶螟,属轻、局部中等发生,田间虫龄以五龄幼虫-蛹为主,预计下代卷叶螟卵盛孵高峰期为8月16-20日。调查点卷叶率和残虫量如下:月山镇簕竹村12%和10000头、蚬冈镇蚬北村10%和8000头、大沙镇蕉园2%和1000头(以上应施药防控),赤水镇和安村未发现、长沙街道办西溪村未发现。

二、稻飞虱,属轻、局部中等发生,田间以白背飞虱低龄幼虫为主。调查点百丛虫量如下:月山镇簕竹村2000头、蚬冈镇蚬北村3000头、大沙镇蕉园1000头(以上应施药防控),赤水镇和安村未发现、长沙街道办西溪村未发现。

三、草地贪夜蛾,近期省内个别地市及恩平市发现草地贪夜蛾为

害水稻，我市尚未发现危害水稻。各镇（街）要充分认识草地贪夜蛾危害水稻的严重性，树立高度政治站位，全力做好调查监测工作，确保晚稻生产丰收。

四、防治意见

本次防治以稻纵卷叶螟、稻飞虱，重点防治区域为早插植田块，防治适期为8月16-18日。近期台风降雨天气集中，已发现害虫迁入我市。各镇（街）应发动群众田间病虫调查，对达到防治指标田块施药防控。

建议农户选用持效期长、粘着性和展着性好的药剂，应对近期的降雨天气影响。药剂推荐亩用量如下：

1. 防治卷叶螟使用 20%氯虫苯甲酰胺 10 克、或 10%四氯虫酰胺 20 克、或 1.8%阿维菌素 100 毫升等；

2. 防治稻飞虱使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克等。

以上药剂兑水 70 公斤均匀喷施，药后 6 小时内遇中雨以上要及时补施。

注意事项：请自觉回收农药包装废弃物，保护农业农村生态环境。