

农作物病虫害情报

第五期

(2022年4月29日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址:开平市长沙良园路60号

Email:kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

早稻封行期病虫害防治意见

据我中心于4月21、24、25、26日到赤水、百合、马冈、苍城、沙塘、长沙、月山、塘口、水口和赤坎等镇(街)调查发现,我市早稻已进入封行期,病虫害总体属轻发生。

一、钻蛀性螟虫,属轻发生。调查点枯心丛率如下:赤水镇沙洲村、百合镇马降龙村、马冈镇北湖村、苍城镇六合村、沙塘镇下丽村、长沙街道民强村、月山镇金村村、塘口镇龙和村、水口镇黎村村、赤坎镇红溪村 $<0.1\%$ 。

二、稻飞虱,属轻发生。调查点百丛虫量如下:百合镇马降龙村、马冈镇北湖村、苍城镇六合村、沙塘镇下丽村、月山镇金村村、塘口镇龙和村、水口镇黎村村、赤坎镇红溪村 <10 头,赤水镇沙洲村、长沙街道民强村 <20 头。

三、纹枯病,属轻发生。调查点病丛率如下:百合镇马降龙村、马冈镇北湖村、苍城镇六合村、沙塘镇下丽村、月山镇金村村、塘口镇龙和村、水口镇黎村村、赤坎镇红溪村 $<4\%$,赤水镇沙洲村、长沙街道民强村 $<6\%$ 。

四、稻瘟病，属轻发生，未发现为害。稻瘟病发病田块及历史病区应及时施药，做好封行期、破口期及齐穗期预防工作。

五、稻纵卷叶螟，属轻发生，未发现为害。

六、防治意见

本次防治以预防为主，挑治钻蛀性螟虫、稻飞虱、纹枯病、稻纵卷叶螟，稻瘟病发病田块及历史稻瘟病区做好稻瘟病预防工作。各镇（街）应根据水稻生长情况施药，做到“早封行早施药，迟封行迟施药”，在5月10日前完成本次防治工作。

建议选用持效期长、粘着性和展着性好的药剂，药剂推荐亩用量如下：

1.防治钻蛀性螟虫及稻纵卷叶螟：使用20%氯虫苯甲酰胺10克、或10%四氯虫酰胺20克、或1.8%阿维菌素100毫升等；

2.防治稻飞虱：使用10%三氟苯嘧啶10毫升、25%噻嗪酮40克、或25%噻虫嗪4克、或25%烯啶虫胺20克、或25%吡蚜酮20克等。

3.防治水稻跗线螨：使用虫螨净、双甲脒、三唑磷、乐斯本等。

4.防治纹枯病：使用19%啶氧·丙环唑67毫升、或32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑30毫升、或30%苯醚甲环唑·丙环唑15毫升、或50%噻呋·己唑醇10克、或20%井冈霉素50克等。

5.防治稻瘟病：使用75%三环唑可湿性粉剂30克、或40%稻瘟灵80毫升等。

以上药剂兑水70公斤均匀喷施，药后6小时内遇中雨以上要及时补施。

注意事项：每年3月-5月为红火蚁春季统一防控行动时间，请各镇（街）落实全面开展我市红火蚁春季统一防控行动。